TESTUDO RADIATA, *Shaw.*

Testâ hemisphæricâ, scutis planis, subimbricato-sulcatis, nigris, luteo-radiatis, areolis subgibbosis; scuto nuchali lato. Pedibus posticis squamis binis corneis, magnis, solidis, posticè armatis.

Testudo tessellata major. Grew, Mus. Reg. p. 37. t. iii. fig. 1.
Testudo Coui. Daud. Rept. II. p. 371. t. xxvi.
Testudo radiata. Shaw, Gen. Zool. III. p. 22. t. ii.—Gray, Syn. Rept. p. 11.

Habitat in Insulâ Madagascar.
Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* squamis magnis tectum, nigro, luteo et rubro variegatum. *Mandibulæ* serrato-denticulatæ. *Pedes anteriores* squamis imbricatis tecti, fusci, luteo et rubro maculati. *Pedes posteriores* fusci, squamis rotundatis defensi; *calces* squamis binis corneis, solidis, sustenti. *Ungues* breves. *Cauda* mediocris. *Testa* altè fornicata, globosa; margine anticè et posticè dentato, lateribus integris. *Scuta dorsalia* nigra, luteo radiata, radiis marginem versus dilatatis, plana, lata, subimbricato-sulcata: *vertebralia* areolis vix elevatis; primum pentagonum, angulo antico truncato; secundum, tertium et quartum hexagona; quintum subquadratum: *costalia* lata, plana, areolis subgibbosis; primum et quartum trapezoidea; secundum et tertium pentagona: *marginalia* alta, lata, areolis inferioribus, radiis luteis flabelliformibus, sursùm expansis; anteriora angulatè porrecta; lateralia quadrata, verticalia; paria quatuor posteriora prominentia, dentato-angulata. *Scutum nuchale* latum, porrectum, apice bidentatum: *caudale* latum, verticale, incurvum. *Sternum* luteo et nigro radiato-tessellatum, planum vel leviter convexum, latum, lobo antico undulato, postico latè emarginato. *Scuta gularia* rhomboidea, porrecta: *humeralia* pentagona, areolâ ad angulum antico-externum posita: *pectoralia* introrsùm angusta, extrorsùm dilatata: *abdominalia* maxima, quadrata, areolis gibbosis: *femoralia* quadrata: *analia* transversè rhomboidea.